


CARABELA AMILOIDOSIS POR TRANSTIRETINA

La Amiloidosis por transtiretina, es una enfermedad progresiva y fatal, con un elevado infradiagnóstico a consecuencia de bajo conocimiento, heterogeneidad de presentación clínica y la multiplicidad de circuitos asistenciales recorridos hasta el inicio de pruebas para su detección.

Carabela Amiloidosis por ATTR, coorganizado por AstraZeneca y 5 sociedades científicas [Sociedad Española de Cardiología (SEC), de la Sociedad Española de Neurología (SEN), de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)], con el objetivo final de optimizar el abordaje de pacientes con amiloidosis desde la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, proporcionando una guía de trabajo para mejorar los procesos asistenciales, mediante la identificación de áreas de mejora, potenciales soluciones e inclusión de indicadores para evaluar el impacto de los cambios.

La metodología CARABELA consta de 4 fases: caracterización, validación, cocreación e implementación.



Para acceder a la información completa sobre la Metodología Carabela, puede consultar el artículo en la revista Journal of Healthcare Quality Research (JHQR):

[Enhancing the management of chronic diseases in clinical practice: The CARABELA methodology - ScienceDirect](https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2024.06.001)

Escalada J, Carretero Gómez J, Anguita M, de Sequera P, García-Río F, Dávila I, et al. Enhancing the management of chronic diseases in clinical practices: The CARABELA methodology. Journal of Healthcare Quality Research. 2024; In press.

<https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2024.06.001>